

CLIENTE: AIFM

TESTATA: BLOG.PIANETAMAMMA.IT

DATA: 23 LUGLIO 2014

Radiazioni in gravidanza: sono pericolose ?

LUGLIO 23, 2014 BY ALLATTAMENTO



Durante la **gravidanza**, sarebbe meglio **evitare** l'esposizione alle radiazioni, ma se ci si deve sottoporre per forza a dei **raggi x**, magari per una frattura o alla **tac** o alla **mammografia** per una sospetta malattia al seno, non si deve necessariamente aspettare la nascita del bambino.

Innanzitutto è bene sapere che i **pericoli variano** in base alla settimana di gestazione. Sono infatti maggiori nelle **primissime settimane** (fino a 12 settimane) perchè proprio in questo periodo c'è la formazione di tutti gli organi e si rischia o l'aborto o malformazioni fetali.

Anche la **dose** delle radiazioni, gioca un ruolo chiave in questo caso. Il dott. Lorenzo Bianchi, coordinatore regionale Lombardia dell'Associazione italiana di fisica medica, afferma che *"Gli effetti nocivi si verificano solo per dosi che sono molto più elevate (da 10 a 100 volte) di quelle che un embrione o un feto possono ricevere per gli esami radiologici o medico nucleari eseguiti a scopo diagnostico"*

E' sempre consigliabile comunque prima di sottoporsi a qualsiasi esame diagnostico come Raggi X, Tac, Mammografie, risonanze, **contattare il medico** di fiducia, che valuterà in base al caso il rapporto rischio-beneficio.